

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**

### **Suprimal tabletten 12,5 mg**

meclozinehydrochloride

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Suprimal zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### **In deze bijsluiter:**

1. Wat is Suprimal en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Suprimal inneemt
3. Hoe wordt Suprimal ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Suprimal
6. Aanvullende informatie

### **1. WAT IS SUPRIMAL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT**

Suprimal bevat meclozine (in de vorm van meclozinehydrochloride) als werkzaam bestanddeel. Meclozine behoort tot de middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica). Meclozine onderdrukt de impuls tot braken door werking op het centraal zenuwstelsel.

Suprimal kan worden gebruikt om misselijkheid en braken die gepaard gaan met wagen-, zee- en luchtziekte te voorkómen en te behandelen. De werking begint na 1 tot 2 uur en houdt ongeveer 8 uur aan.

### **2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SUPRIMAL INNEEMT**

#### **Neem Suprimal niet in**

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor meclozinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Suprimal.

#### **Inname met andere geneesmiddelen**

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gelijktijdig gebruik van Suprimal met alcohol, slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en angstmiddelende middelen dient vermeden te worden, aangezien de werking van deze middelen versterkt kan worden.

#### **Inname van Suprimal met voedsel en drank**

Gelijktijdig gebruik van Suprimal met alcohol dient vermeden te worden aangezien Suprimal de werking van alcohol kan versterken.

#### **Zwangerschap en borstvoeding**

### *Zwangerschap*

Suprimal kan na overleg met uw arts tijdens de zwangerschap volgens de gebruiksaanwijzing in deze bijsluiter worden gebruikt.

### *Borstvoeding*

Het is niet bekend of meclozine in de moedermelk wordt uitgescheiden; gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden. Indien gebruik van Suprimal noodzakelijk wordt geacht, moet geen borstvoeding gegeven worden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Het gebruik van Suprimal voor of tijdens het autorijden wordt bestuurders afgeraden, omdat zich bij dit geneesmiddel slaperigheid kan voordoen. Om dezelfde reden wordt afgeraden om tijdens het gebruik van Suprimal machines te bedienen.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Suprimal**

Suprimal bevat 148.9 mg lactose per tablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Suprimal bevat zonnegeel aluminium lak (E110). Deze kleurstof kan allergische reacties veroorzaken.

## **3. HOE WORDT SUPRIMAL INGENOMEN**

Volg bij het innemen van Suprimal nauwgezet deze gebruiksaanwijzing. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De dosering is als volgt:

### *Volwassenen en ouderen*

2 tabletten.

### *Kinderen*

Kinderen boven 6 jaar: 1 tablet. Kinderen van 3-6 jaar: een halve tablet.

De tabletten innemen 1 à 2 uur vóór de aanvang van de reis. Zo nodig herhalen na 6-8 uur. De tabletten in hun geheel of in enige delen gebroken innemen met een slok water (voor kinderen b.v. limonade) en het glas leegdrinken.

### **Wat u moet doen als u meer van Suprimal heeft ingenomen dan u zou mogen**

Wanneer u of iemand anders te veel van Suprimal heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat bij voorkeur de verpakking of deze bijsluiter zien.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan Suprimal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Tijdens het gebruik van Suprimal kan sufheid optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

## **5. HOE BEWAART U SUPRIMAL**

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Suprimal niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de strip na Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

### **Wat bevat Suprimal**

- Het werkzame bestanddeel is meclozinehydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn lactose, magnesiumstearaat (E470b), maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, watervrij siliciumdioxide (E551), gepregelatineerd zetmeel, zonnegeel aluminium lak (E110), polysorbaat 80.

### **Hoe ziet Suprimal er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Suprimal tabletten zijn ronde, oranje, vlakke tabletten, voorzien van een breukstreep. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Suprimal is verkrijgbaar in een kartonnen doosje met een doordrukstrip à 10 tabletten.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

Remark Pharma  
Industrieweg 24  
7949 AK Rogat

*Fabrikant*

Dragenopharm Apotheker Pueschl GmbH  
Göllstrasse 1  
D-84529 Tittmoning  
Duitsland

of

SoliPharma BV  
Industrieweg 11a  
4731 SB Oudenbosch

### **RVG nummer**

Suprimal is in het Register ingeschreven onder RVG 03189.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2017**